

Informatie over:

Mesalazine bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter geen vervanging van de bijsluiter. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee terecht bij uw behandelend arts of IBD verpleegkundige.

Algemeen

Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa niet bekend. Elke behandeling is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De ziekte geneest niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met deze medicijnen kunnen de klachten weer terug komen.

Werking

Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dunne- en dikke darm. Nadat Mesalazine is ingenomen komt het via de maag in de darm terecht. De werkzame stof komt vrij in de dunne darm. De werking treedt geleidelijk in.

Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen.

Mesalazine is bekend onder vele merknamen, zoals Pentasa, Asacol, Salofalk en Mezavant.

Gebruik

Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten, zetpillen, klysma's of granulaat (korrels). Tegenwoordig wordt Mesalazine vaak

1 tot 2 keer per dag in hogere dosering gegeven. Uw behandelend arts kan hier natuurlijk van afwijken.

Wanneer?

Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat kunt u met een lepel met vla, yoghurt of kwark innemen.

Bijwerkingen

Mesalazine heeft meestal weinig bijwerkingen. Heeft u echter last van bijwerkingen, raadpleeg dan altijd uw behandelend arts of verpleegkundige. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Huiduitslag, jeuk;
- Misselijkheid;
- Diarree;
- Haaruitval;
- Duizeligheid, hoofdpijn;
- Stemningsveranderingen;

Informatie over:

Mesalazine bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

- Nierfunctiestoornis (zelden).

U merkt zelf niets van een nierfunctiestoornis. Daarom controleert uw arts uw bloed minstens 1 keer per jaar.

Zwangerschap/Vruchtbaarheid en Borstvoeding

Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw. Mesalazine kan tijdens de zwangerschap veilig gebruikt worden.

Mocht er een zwangerschapswens zijn, maak dit dan altijd bespreekbaar bij uw behandelend arts of IBD verpleegkundige. Tijdens de periode van borstvoeding kan Mesalazine ook worden gebruikt.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige.

Belangrijke telefoonnummers

- Ziekenhuis Amstelland
Telefoonnummer 020- 755 7000
- Polikliniek Maag-, darm en leverziekten
Telefoonnummer 020- 755 7023
- IBD verpleegkundige, voor het maken van een (telefonische) afspraak
Telefoonnummer 020- 755 7120
E-mail: ibdverpleegkundige@zha.nl
- Huisartsenpost Amstelland
Telefoonnummer 020- 456 2000
- Dagbehandeling
Telefoonnummer 020- 755 6637