

Informatie over:

Sigmoïdoscopie

Thuis laxeren

Sigmoïdoscopie

In overleg met uw arts heeft u besloten om een sigmoïdoscopie te laten verrichten. Bij dit onderzoek wordt de laatste 50 cm van de dikke darm bekeken met behulp van een flexibele bestuurbare slang (ook wel endoscoop genoemd). Deze slang van 1 cm dikte heeft aan het uiteinde een camera en een lampje, deze wordt ingebracht via de anus.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek maakt het mogelijk darmafwijkingen op te sporen, zoals ontstekingen, uitstulpingen (zogenoemde divertikels), poliepen of gezwellen. Ook kunnen weefselmonsters worden afgenomen (biopsie) voor verder onderzoek.

Belangrijk bij het maken van uw afspraak

Bij het maken van de afspraak graag vermelden of u:

- bloedverduunners gebruikt (deze moeten soms onderbroken worden).
- ijzertabletten gebruikt (deze moeten 5 dagen voor het onderzoek gestaakt worden).
- zwanger bent (u mag dan geen laxeermiddelen gebruiken).

ID en verzekeringsbewijs

Neem bij uw bezoek altijd uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee. Als u voor de eerste keer in Ziekenhuis Amstelland komt, dient u zich eerst in te schrijven bij de Inschrijfbalie. Ook als uw gegevens sinds de laatste keer dat u in Ziekenhuis Amstelland was gewijzigd zijn, dient u zich opnieuw te melden bij de Inschrijfbalie.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met het secretariaat van de internisten, telefoonnummer 020 – 755 7023.

Vorbereidingen thuis

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als het laatste deel van de darm goed schoon is. Om deze reden heeft de huisarts u laxeermiddelen (bisacodyl) voorgeschreven. Deze laxeermiddelen kunnen darmkrampen veroorzaken.

- De avond voor het onderzoek slikt u om ongeveer 19:00 uur twee tabletten bisacodyl.
- De dag van het onderzoek brengt u 3 uur voor uw afspraak een bisacodyl-zetpil via de anus in. Deze pil werkt na ongeveer 1 uur.

U kunt de dag van het onderzoek normaal eten en drinken.

Waar meldt u zich?

Vanaf de hoofdingang volgt u de bordjes Endoscopieafdeling C 41. Wij verzoeken u zich daar bij de balie te melden met de aanvraag/verwijzing van de huisarts of specialist.

Informatie over:

Sigmoïdoscopie

Thuis laxeren

Het onderzoek

Het onderzoek duurt 15-20 minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerkzijde met opgetrokken knieën. De arts brengt de endoscoop geleidelijk in via de anus (sluitspier). Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen om de darm te ontplooien en goed zicht te krijgen. Hierdoor wordt de darmwand uitgerekt. Dit kan krampen veroorzaken die u als pijnlijk kunt ervaren. Ook kan een gevoel van aandrang optreden. Geneert u zich niet om de ingeblazen lucht te laten ontsnappen. Dit lucht vaak op. Zo nodig wordt tijdens het onderzoek een stukje weefsel afgenomen (biopt). Hier voelt u niets van. U kunt tijdens het onderzoek meekijken op de monitor.

De uitslag

De arts die het onderzoek heeft verricht, bespreekt met u na afloop in het kort de bevindingen. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is niet meteen beschikbaar. De arts spreekt met u af wanneer u deze uitslag krijgt.

Na het onderzoek

- Indien er bipten zijn genomen, kunt u gering bloedverlies hebben.
- Eventuele pijn en krampen verdwijnen meestal binnen enkele uren. Wandelen of een toiletbezoek kan hierbij helpen.
- U kunt gewoon weer op eigen gelegenheid naar huis.
- U kunt normaal eten en drinken.

Complicaties

Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek. Complicaties komen vrijwel nooit voor. Zeer zeldzame complicaties zijn een perforatie (scheurtje of gat in de darmwand) of een nabloeding.

Vragen en/of problemen

Wij willen u op het hart drukken in de volgende gevallen meteen contact op te nemen met het ziekenhuis:

- veel bloedverlies;
- heftige buikpijn;
- andere problemen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis (020 – 755 7000).

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw behandeld arts of de receptie van het Behandelcentrum (telefoonnummer: 020 – 755 7120).