

Informatie over:

# Duplexonderzoek

Duplexonderzoek is het minst belastende onderzoek om uit te zoeken waar een vernauwing in de bloedvaten zit. Het is een echo-onderzoek gecombineerd met Doppler.

- Er wordt gel op het betreffende lichaamsdeel aangebracht.
- Met een echoscopiekop wordt de huid afgetast.
- Met behulp van Dopplersignalen wordt de snelheid van de bloedstroom gemeten en kan de plaats van de vernauwing aangewezen worden.

Er wordt meestal van boven naar beneden gescand.

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

## **1. Buik**

Het kan zijn dat op de buik wat harder gedrukt moet worden, wat soms een beetje vervelend is. Verder is dit onderzoek niet pijnlijk. Het duurt maximaal circa 45 minuten.

## **2. Been**

Het onderzoek duurt circa 30 minuten.

## **3. Arm**

Het onderzoek duurt circa 30 minuten.

## **4. Hals**

Het onderzoek duurt circa 30 minuten.

## **Uitslag**

U krijgt de uitslag van het onderzoek of de onderzoeken van uw behandelend specialist.

## **Vragen?**

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie via telefoonnummer 020 – 755 7014.