

Informatie over:

# Histamineprovocatietest

Uw specialist heeft een of meer onderzoeken op de afdeling Longfunctie voor u aangevraagd. De belangrijkste functies van uw longen zijn het lichaam van zuurstof te voorzien en koolzuurgas te verwijderen. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij of zij het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en/of de aard van uw aandoening die daar mogelijk de oorzaak van is.

In deze folder kunt u nog eens rustig nalezen hoe u zich voor kunt voorbereiden op het onderzoek en wat het onderzoek inhoudt.

## Het onderzoek

Bij een provocatietest wordt eventuele overgevoeligheid van de luchtwegen bepaald. Hierbij wordt gebruikgemaakt van histamine, een lichaamseigen stof. Tijdens de test zal u worden gevraagd om door een longfunctieapparaat zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig mogelijk uit te blazen. Met tussenpozen krijgt u een histamineoplossing om in te ademen. Daarna moet u weer een aantal keren krachtig uitblazen.

Als uw luchtwegen geprikkeld raken, kunnen zij zich vernauwen en kunt u mogelijk klachten ervaren, zoals een gevoel van benauwdheid of een hoestprikkel. Eventueel krijgt u een luchtwegverwijdend medicament om in te ademen aan het einde van het onderzoek.

Indien u zwanger bent of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, geef dit dan door aan de longfunctieanalist. Er bestaat een mogelijkheid dat de afspraak op dat moment niet door zal kunnen gaan.

Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

## Vorbereiding op het onderzoek

- Antihistaminica en sommige longmedicatie dient u een bepaalde tijd vóór het onderzoek te staken. Lees aan het einde van deze folder welke medicatie gestaakt dient te worden. Als u twijfelt of u uw medicatie moet stoppen, vraag het dan na bij de afdeling Longfunctie via telefoonnummer 020 – 755 6212.
- U mag gewoon eten en drinken vóór het onderzoek.
- Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd.

## Begeleider/kinderen meenemen

Eventuele begeleiding mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek, maar kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

## De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u ook het vervolg.

## Waar meldt u zich?

De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

## Contact

Heeft u nog vragen of wilt u graag specifiekere informatie, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten (020 – 755 7031).

Informatie over:

# Histamineprovocatietest

**U DIENT DE VOLGENDE MEDICATIE TE STAKEN VÓÓR HET ONDERZOEK**

## **6 uur van tevoren staken**

- Airomir (Salbutamol)
- Bricanyl (Terbutaline)
- Ventolin (Salbutamol)

## **12 uur van tevoren staken**

- Atrovent (Ipratropium)
- Berodual (Fenoterol + Ipratropium)
- Combivent (Salbutamol + Ipratropium)

## **36 uur van tevoren staken**

- Aerivo (Salmeterol + Fluticason)
- AirFluSal Forspiro (Salmeterol + Fluticason)
- Atimos (Formoterol)
- Bevespi (glycopyrroniumbromide/formoterol)
- Bufoler Easyhaler (Formoterol + Budesonide)
- Busalair (Salmeterol + Budesonide)
- Duaklir Genuair (Aclidinium + Formoterol)
- DuoResp Spiromax (Formoterol + Budesonide)
- Elpenhaler (Salmeterol + Fluticason)
- Eklira Genuair (Aclidinium)
- Flutiform (Formoterol + Fluticason)
- Foradil (Formoterol)
- Foster (Formoterol + Beclomethason)
- Oxis (Formoterol)
- Seretide (Salmeterol + Fluticason)
- Serevent (Salmeterol)
- Symbicort (Formoterol + Budesonide)
- Singulair (Montelukast)
- Semprex (Acrivastine)

## **48 uur van tevoren staken**

- Daxas (Roflumilast Actieve Metaboliet)
- Onbrez (Indacaterol)
- Relvar Ellipta (Fluticasonfuroaat + Vilanterol)
- Striverdi (Olodaterol)
- Theolair Retard (Theofylline)
- Unilair (Theofylline)

## **168 uur (één week) van tevoren staken**

- Anoro (Umeclidinium/Vilanterol)
- Incruse Ellipta (Umeclidinium)
- Seebri (Glycopyrronium)
- Spiriva (Tiotropium)
- Spiolto (Tiotropium/Olodaterol)
- Tiotrus Zonda (Tiotropium)
- Trelegy Ellipta (Fluticason + Vilanterol + Umeclidinium)
- Trimbaw (Beclometasondipropionaat + Formoterolfumaraatdihydraat + Glycopyrronium)
- Ultibro (Indacaterol + Glycopyrronium)
- Xoterna (Indacaterol + Glycopyrronium)

Informatie over:

# Histamineprovocatietest

## **72 uur (drie dagen) van tevoren staken**

- Aerius, Neoclarityn (Desloratadine)
- Allerfre, Claratine (Loratadine)
- Hydroxyzine
- Cinnarizine
- Cyclizine
- Emesafene (Meclozine/Pyridoxine)
- Fenistil
- Kestine (Ebastine)
- Ketotifen, Zaditen (Ketitofen)
- Promethazine
- Reactine, Zyrtec, Prevalin allerstop (Cetirizine)
- Semprex (Acrivastine)
- Suprimal (Meclozine)
- Tavegyl (Clemastine)
- Telfast (Fexofenadine)
- Xyzal (Levocetirizine)
- Nedeltran (Alimenazine)
- Mizollen (Mizolastine)
- Rupafin (Rupatadine)
- Primatour (Chloorcyclizine/Cinnarizine)
- Toplexil (Oxomemazine)
- Zyrtec (Cetirizine)

## **Het is niet nodig om te stoppen met:**

- Alvesco (Ciclesonide)
- Flixotide (Fluticasonpropionaat)
- Pulmicort (Budenoside)
- Qvar (Beclomethason)