

Informatie over:

Zwangerschapsafbreking met medicijnen

Wanneer behandeling met medicijnen?

Een zwangerschapsafbreking (abortus) met medicijnen is goed mogelijk tot 7 weken zwangerschapsduur (49 dagen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie). Deze methode is bij deze termijn bijna altijd succesvol.

Tussen 7 en 9 weken zwangerschapsduur is er meer kans op overmatig bloedverlies en pijn.

Welke medicijnen krijg ik?

De behandeling bestaat uit mifepriston (Mifegyne®) 200 mg tablet oraal (via de mond) en misoprostol (Cytotec®) 800 µg vaginaal in één dosis (vier tabletten van 200 µg).

Mifepriston remt de werking van het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron. Progesteron is nodig om de zwangerschap in stand te houden. Mifepriston zorgt ervoor dat de baarmoeder gevoelig wordt voor de weeënopwekkende werking van andere middelen, zoals misoprostol.

Misoprostol zorgt dat de baarmoedermond week wordt en dat een miskraam in gang wordt gezet. Misoprostol is niet officieel geregistreerd voor het beëindigen van een zwangerschap, maar is op de markt gebracht als medicijn tegen maagklachten. Uit onderzoek blijkt dat misoprostol een goed medicijn is om een miskraam op te wekken. Dit middel brengt u via de vagina in. Het werkt dan beter en u heeft minder bijwerkingen.

Wat zijn de voordelen van medicijnen?

Vanwege het verhoogde risico op vroeggeboorte in (een) volgende zwangerschap(pen) bij een vacuümcuretage en het verschil in kosteneffectiviteit gaat de voorkeur uit naar een zwangerschapsafbreking met medicijnen. Er is geen operatie nodig en u kunt meestal thuis de behandeling ondergaan.

Wat zijn de nadelen?

Mogelijke bijwerkingen van de medicijnen zijn: buikpijn, bloedverlies, diarree, misselijkheid, braken, rillingen, koorts, hoofdpijn en duizeligheid.

Als de behandeling niet slaagt, is alsnog een curettage nodig. Dit gebeurt bij ongeveer 4 op de 100 behandelingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

U krijgt een recept mee en kunt de medicatie ophalen bij de Nicolaes Tulp Apotheek, gevestigd in Ziekenhuis Amstelland.

Het tablet mifepriston (200 mg) kunt u thuis via de mond innemen (oraal). Na 36 tot 48 uur brengt u de vier tabletten misoprostol 200 µg (totaal 800 µg) zo hoog mogelijk in de vagina in.

Na het inbrengen van de vaginale tabletten krijgt u meestal binnen 2-6 uur krampen en vaginaal bloedverlies. Het bloedverlies kan hevig zijn, zoals een forse menstruatie of nog wat meer. Meestal treedt een miskraam binnen enkele uren op. Hierna wordt de pijn minder. Het bloedverlies vermindert ook, maar u kunt nog tot 2 weken wisselend bloedverlies houden.

Informatie over:

Zwangerschapsafbreking met medicijnen

Pijnstilling

Bij pijn kunt u ibuprofen, naproxen of diclofenac nemen volgens het voorschrift op de verpakking. Eventueel samen met paracetamol (maximaal 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg).

Hoe weet ik of de behandeling geslaagd is?

Met het bloedverlies komt de zwangerschap mee. Soms is deze te herkennen als een klein blaasje of een vliesje met vlokjes. Maar in de meeste gevallen is door de bloedstolsels niet te zien of u de zwangerschap hebt verloren. Als binnen 2 weken een complete miskraam is opgetreden, kunt u na 3 weken zelf thuis een zwangerschapstest in de urine doen.

Bij een positieve zwangerschapstest kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie voor beoordeling van de klinische situatie.

Wanneer controle?

Er wordt een consult gepland na 2-3 weken op de poli Gynaecologie voor een echoscopische controle. Bij een incomplete miskraam of een doorgaande zwangerschap kan nogmaals misoprostol worden gegeven of een vacuümcurettage worden aangeboden.

Niet doen

Na de behandeling staat de baarmoedermond nog enige tijd open. Daarom mag u de eerste 2 weken:

- geen tampon gebruiken;
- geen geslachtsgemeenschap hebben;
- niet zwemmen.

Menstruatie

De menstruatie komt na 4-6 weken weer op gang, soms later.

Anticonceptie

De gynaecoloog heeft met u de anticonceptie na de behandeling besproken. Met de anticonceptiepil (of anticonceptivering of -pleister) kunt u starten na de telefonische controleafspraak. Een spiraal kan indien gewenst bij een vervolgspraak worden geplaatst. Bedenk dat een eisprong al weer binnen 4 weken kan plaatsvinden!

Wanneer moet ik bellen?

- Bij bloedverlies dat veel meer is dan een menstruatie **EN** dat langdurig aanhoudt.
- Bij duizeligheid of neiging tot flauwvallen.
- Als er na 48 uur niets gebeurd is.
- Bij andere klachten of vragen.

Telefoonnummers

- Overdag polikliniek Gynaecologie: 020 – 755 7019
- Buiten kantooruren verpleegafdeling: 020 – 755 7104
- Of het algemene ziekenhuisnummer: 020 – 755 7000