

Informatie over:

Meckels divertikel scintigrafie (maagslijmvliesscan)

Wat is een Meckels divertikel scintigrafie?

Een Meckels divertikel scintigrafie is een onderzoek om te bepalen of er zich maagslijmvlies in de dunne darm bevindt (Meckels Divertikel).

De voorbereiding

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u op de dag voorafgaand aan het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten of drinken. Tevens mag u de drie dagen voorafgaand aan het onderzoek geen maag- en/of darmonderzoeken ondergaan. Zorg dat u makkelijke kleding aan heeft, bij voorkeur zonder metaal en steentjes.

Melden in het ziekenhuis

U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- Uw verzekeringspas
- Uw medicatielijst

Medicatie

Eventueel gebruik van medicijnen die de darmmotoriek beïnvloeden dient u drie dagen voorafgaand aan het onderzoek te staken.

Zantac

Twee dagen voorafgaand aan het onderzoek moet u het medicijn Zantac innemen, dit krijgt u van uw behandelend arts.

Het onderzoek

U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Wanneer u onder de camera ligt, krijgt u via een infuus een licht radioactieve vloeistof toegediend, u merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof. Direct na toediening van de radioactieve vloeistof worden de opnamen gestart. Het onderzoek duurt ongeveer 70 minuten.

Radioactieve vloeistof

Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

Informatie over:

Meckels divertikel scintigrafie (maagslijmvliesscan)

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen

Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?

Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaan Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.45 uur bereikbaar.

