

Er is bij u een Inwendige Loop Recorder (ILR) geplaatst. In deze folder staat hoe u het wondje kan verzorgen en wanneer u contact met ons dient op te nemen. Verder leest u terug hoe u de ILR kan gebruiken.

Wondverzorging na implantatie

Het wondje is gesloten met oplosbare hechtingen. Als er na 10 dagen nog een stukje uitsteekt dan kunt u het beste het draadje verwijderen door eraan te trekken of het door te knippen.

Op het wondje zit een doorzichtige pleister. Deze moet er uiterlijk 4 dagen na de implantatie af. U kunt met de pleister douchen. Na het verwijderen van de pleister kunt u het wondje afspoelen onder de douche. U kunt het wondje afspoelen door een washandje over de wond te vegen of door te borstelen wanneer het wondje helemaal dicht is.

Er kan een blauwe plek ontstaan, dat is normaal en niet verontrustend.

Indien u pijn heeft op de implantatieplek kunt u Paracetamol gebruiken.

Bij ontstekingsverschijnselen zoals roodheid, zwelling, kloppen en meer pijn moet u contact opnemen met ons via de polikliniek cardiologie (tel. 020-755 7005) of via de receptie (tel. 020-755 7000).

Handleiding van de inwendige recorder

Wanneer u bent weggeraakt of duizelingen ondervindt probeert u zo snel mogelijk het meegegeven kastje boven de recorder te houden volgens de instructies. Als dit niet direct lukt is dit geen groot probleem.

U maakt dan een afspraak met de pacemakertechnicus via de polikliniek of via het Klant Contact Centrum (beide te bereiken via 020-7557005).

Bij ernstige/langdurige wegrakingen buiten kantooruren kunt u ofwel 112 bellen, ofwel via de receptie (tel 020-7557000) de arts-assistent cardiologie bereiken voor overleg.