

Galblaasdrain plaatsen

De chirurg heeft, samen met u besloten, dat het plaatsen van een galblaasdrain noodzakelijk is.

Wat is een galblaasdrain?

Een galblaasdrain is een tijdelijke buis (drain) die gal uit de galblaas of galwegen afvoert. Dit wordt vaak gedaan als de galblaas ontstoken is (bijvoorbeeld door galstenen), of als er een verstopping of infectie is.

De galblaasdrain helpt om overtollig gal, die zich niet goed kan afvoeren, naar buiten te leiden. Dit voorkomt verdere complicaties.

Waarom heeft u een galblaasdrain nodig?

- Om blokkades te verlichten in de galwegen.
- Om ontstekingen of infecties in de galblaas te verminderen.
- Om complicaties, zoals galblaasperforatie of galweginfecties, te voorkomen.

Hoe wordt een galblaasdrain geplaatst?

De galblaasdrain wordt onder lokale verdoving geplaatst. Terwijl de radioloog een echo maakt wordt de drain geplaatst via een kleine incisie in de huid. De drain wordt zorgvuldig ingebracht naar de galblaas om het gal af te voeren. De ingreep duurt meestal niet langer dan 30-60 minuten.

Wat kunt u verwachten na de procedure?

- U kunt enige pijn of druk voelen op de plaats waar de drain is ingebracht. Dit is normaal en kan worden behandeld met pijnmedicatie.
- Er zal gal (groen/bruin) of pus (geel/wit of geelbruin of groen) via de drain naar buiten komen. Dit kan een paar dagen tot weken duren.

Nazorg en instructies:

- **Hygiëne:** Was uw handen voordat u de drain aanraakt. Het is belangrijk om de drain schoon te houden en regelmatig te controleren op tekenen van infectie, zoals roodheid, zwelling of afscheiding.
- **Spoelen:** De drain wordt door de thuiszorg of door u zelf 1x per dag met 10ml NACL gespoeld. De vloeistof kan zowel terug in de zak komen als langs de drainopening lekken. Beide is normaal.
- **Drainproductie:** De galdrain productie kan per dag wisselen. Dat is normaal. Als u merkt dat de hoeveelheid gal afneemt of stopt, neem dan contact op met het ziekenhuis.
- **Vervangen drainzak en pleister:** De drainzak moet 1x in de week worden vervangen. De drain zit meestal vast geplakt met een vlinderpleister, deze moet ook 1x in de week vervangen worden.
- **Activiteit:** Vermijd intensieve lichamelijke activiteit totdat de drain is verwijderd.

Galblaasdrain plaatsen

Wanneer wordt de drain verwijderd?

De galblaasdrain blijft meestal op zijn plaats totdat de ontsteking of blokkade is opgelost. Dit kan enkele dagen tot een paar weken duren, afhankelijk van uw herstel. De arts zal u adviseren wanneer het veilig is om de drain te laten verwijderen.

Wat gebeurt er als de drain wordt verwijderd?

Het verwijderen van de drain is meestal niet pijnlijk en gebeurt zonder verdoving op de polikliniek. Na verwijdering van de drain kunt u de normale activiteiten vaak weer oppakken, hoewel het belangrijk is om de instructies van uw arts te blijven volgen voor verdere zorg.

Vragen of zorgen?

Als u vragen heeft over de procedure, de verzorging van uw drain of uw herstel, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw arts of zorgverlener. Wij zijn hier om u te ondersteunen.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

- Uw temperatuur is 38.5 graden of hoger of u heeft koude rillingen.
- U heeft aanhoudende pijn of roodheid rond de drain.
- U geeft langdurig over.
- U heeft heftige buikpijn.
- U heeft wondproblemen.
- U maakt zich veel zorgen en vertrouwt het niet.

U kunt contact met ons opnemen via MijnZHA via de website mijnzha.nl of gebruik de



Ook kunt u ons mailen via chirurgie@zha.nl of bellen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 020-7557000 of poli chirurgie: 020-7557014