

Prostaat echografie (TRUS) met biopsie

Een biopsie wordt gedaan als er een verdenking van prostaatkanker (kwaadaardig gezwel) bestaat. Indien dit nodig is, bespreekt de uroloog dit vooraf met u, dus niet op het moment dat u een afspraak heeft voor TRUS. Een echografie van de prostaat. Voorafgaan de biopsie is in de meeste gevallen eerst een MRI van de prostaat gemaakt.

Bij een prostaatbiopsie worden stukjes weefsel uit de prostaat gehaald met een dikke, holle naald. Zo'n stukje weefsel heet een bipt. De biopsie wordt samen gedaan met een echografie en aan de hand van de gemaakte MRI.

Voorbereiding

Om infectiegevaar te verminderen, krijgt u een recept voor antibiotica:

- De avond vóór het onderzoek neemt u 1 tablet.
- De ochtend van het onderzoek neemt u 1 tablet.
- De dag na het onderzoek neemt u 's morgens 1 tablet.

Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. Deze bespreekt met u of het gebruik van deze medicijnen een aantal dagen voor de biopsie moet stoppen. Deze medicijnen zijn bijvoorbeeld: Ascal, Acenocoumarol, Plavix, Xarelto.

De biopsie is niet pijnloos. Deze kan gevoelig zijn, maar wordt meestal goed verdragen. U kunt ter pijnstilling, een uur voorafgaand aan de ingreep, twee tabletten paracetamol van 500 mg innemen.

Biopsie

Bij de biopsie wordt een aantal stukjes weefsel weggenomen met een naald; er worden als het ware pijpjes weefsel uit de prostaat 'geschoten'. De uroloog brengt de naald via de echosonde in de prostaat, waarmee eerst verdoving (lidocaïne) de prostaat wordt ingebracht, alvorens de uroloog 'hapjes' uit de prostaat haalt. Afhankelijk van de grootte van de prostaat wordt het aantal bipten bepaald.

Uitslag van het onderzoek

Het duurt meerdere dagen voor het laboratoriumonderzoek van het weefsel klaar is. Voor de uitslag krijgt u een nieuwe afspraak met de uroloog.

Nazorg

Na de biopsie mag u direct naar huis. Zelf autorijden of op de fiets naar huis na de biopsie wordt afgeraden. Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat iemand u naar huis rijdt. Het is verstandig om de eerste 2 dagen na de biopsie rustig aan te doen en niet te fietsen.

Prostaat echografie (TRUS) met biopsie

De eerste dagen kan er bloed bij uw urine en ontlasting zitten. Wij adviseren u daarom om extra te drinken.

In het sperma kan nog enkele weken wat bloed zitten. Met name bij de zaadlozing kan bloedverlies langere tijd voorkomen.

Als de urine weer helder is, mag u uw bloed verdunnende medicijnen weer innemen. Tenzij de uroloog anders heeft overlegd met u.

Contact opnemen

In de volgende situaties neemt u contact op met de polikliniek Urologie:

- Bij koorts (temperatuur 38,5°C of hoger) en/of koude rillingen.
- Als het bloedverlies in de urine of ontlasting langer dan 7 dagen duurt.

Doordeweeks kunt u van 8.30-16.30 uur telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie (020 – 755 7038).

Buiten deze tijden of in het weekend kunt u contact opnemen met het algemene nummer (020 – 755 7000).