

Dit onderzoek is bedoeld om de dunne darm zichtbaar te maken en gebeurt op de CT, op de afdeling Radiologie. Een CT is een röntgenapparaat waarbij in één keer meer foto's ('plakjes') van de binnenkant van uw lichaam gemaakt worden. Met behulp van een computer zijn meer details te zien dan op een gewone röntgenfoto. De CT heeft de vorm van een grote open ring.

## Vorbereiding

Belangrijk is dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijft: niet eten, drinken of roken. Eventuele medicijnen kunt u innemen met een klein beetje water.

Een half uur voor de afspraaktijd meldt u zich bij de afdeling Radiologie. In die tijd drinkt u in de wachtkamer het water dat u heeft gekregen en mag u niet meer plassen:

- 30 tot 15 minuten voor het onderzoek: 450 ml
- 15 tot 5 minuten voor het onderzoek: 450 ml
- 5 minuten voor onderzoek: 225 ml

## Onderzoek

U krijgt ter voorbereiding een injectie met een middel om uw darmen te ontspannen. Er is een kleine kans dat u door deze injectie tijdelijk wazig ziet. Het advies is om na het onderzoek niet zelf auto te rijden, of een half uur te wachten tot uw zicht is hersteld.

Voor het onderzoek neemt u plaats op de onderzoekstafel van de CT en drinkt u de laatste beker water. Tijdens het onderzoek schuift u een paar keer langzaam door de CT opening. Blijft u goed stilliggen. Via de intercom krijgt een instructie hoe u moet ademen (inademen — doorademen). Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

## Belangrijk

Mocht u zwanger zijn, of denken dit te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek aan de radiodiagnostisch laborant.

## Contrastmiddel (met jodium)

Ook krijgt u tijdens het onderzoek een injectie in de arm met contrastvloeistof. Het inspuiten van dit contrastmiddel kan een warm gevoel door het hele lichaam geven, een vieze smaak in de mond en een gevoel dat u moet plassen. Deze verschijnselen trekken snel weer weg.

Jodiumhoudende contrastmiddelen zijn middelen waarbij zelden bijwerkingen worden gezien. Via bloedonderzoek wordt onderzocht of de werking van de nieren voldoende is om contrast toe te dienen. Zo nodig neemt uw behandelend arts maatregelen waardoor het CT onderzoek wel door kan gaan. Heeft u eerder een allergische reactie gehad in verband met het toedienen van een contrastmiddel in de ader, dan moet u dit vóór het onderzoek melden aan uw arts of de radiodiagnostisch laborant.

## Na het onderzoek

U kunt weer gewoon eten en drinken.

## De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag.