

PICC lijn

Uw arts heeft aangegeven dat er bij u een PICC lijn wordt ingebracht. Dit is nodig voor uw verdere medische behandeling. PICC staat voor 'Perifeer Ingebrachte Centrale Katheter'.

De PICC lijn

De PICC lijn is een speciaal type intraveneuze lijn (ook wel infuus genoemd). Het is een dunne flexibele katheter, die wordt geplaatst als u voor langere tijd IV-therapie moet ondergaan. Via deze lijn kan men alle soorten IV-medicatie/vloeistoffen toedienen. Deze lijn is daarnaast ook geschikt voor het toedienen of afnemen van bloed(producten) en het toedienen van contrastvloeistof als u een CT-scan moet ondergaan.

Met de juiste zorg en aandacht, is de PICC-lijn een zeer veilige manier voor het toedienen van medicijnen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat pijn wordt voorkomen doordat voor meerdere behandelingen maar één keer aangeprikt hoeft te worden.

Waar en door wie vindt het inbrengen plaats?

Het plaatsen van de PICC vindt meestal plaats in de radiologiekamer, aan het bed van de patiënt of in een operatie/onderzoekkamer. Een PICC lijn wordt ingebracht door een arts of verpleegkundige, die hiervoor speciaal is opgeleid.

Hoe wordt een PICC lijn ingebracht?

De PICC wordt ingebracht in een ader in de bovenarm en eindigt net boven het

hart. Daarom wordt dit een centrale katheter genoemd. Er wordt in beide armen gezocht naar een geschikt bloedvat met behulp van een echoapparaat. U wordt vervolgens afgedekt met steriele doeken. Er wordt een stuwband rond de arm gedaan en vervolgens wordt het bloedvat aangeprikt. Dit voelt aan als het aanprikken met een naald.

Vervolgens wordt u plaatselijk verdoofd, dit geeft een prikkelend gevoel. Via een ingebrachte voerdraad wordt de PICC katheter opgevoerd tot vlakbij het hart. Hier voelt u niets van. De katheter wordt afgedekt met een fixerende pleister. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om de plaats van de katheter vast te leggen. Bij het plaatsen van een PICC komt een klein beetje bloedverlies vrij.

Verzorging PICC lijn

Maximaal 24 uur nadat de PICC is ingebracht, wordt het verband vervangen. De PICC wordt hierna opnieuw steriel verbonden. Dit gebeurt op de afdeling (als u opgenomen bent), op de dagbehandeling of thuis door een gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundige.

Voor het blijvend functioneren van de PICC-lijn, is het extra belangrijk dat deze niet geïnfecteerd raakt. De katheter moet daarom wekelijks worden doorgespoten, ook als deze niet in gebruik is. Dit kan op de (poli)kliniek of via de thuiszorg gedaan worden. De verpleegkundige geeft u hierover meer informatie.

Alle nieuwe patiënten die een PICC lijn krijgen, moeten de verbandmaterialen bij de apotheek ophalen. De kosten voor deze verbandmaterialen komen voor eigen rekening. Deze rekening kan u zelf bij uw verzekering indienen. Niet alle verzekeraars vergoeden deze verbandmaterialen. Voor de eerste maand zijn de kosten hiervan ongeveer 60 euro, de weken hierna kan materiaal los besteld worden en zijn de kosten lager.

Wanneer contact opnemen?

Zolang u de PICC lijn heeft, is het belangrijk om op tijd eventuele klachten aan te geven. Let op bij:

- roodheid, zwelling en gevoeligheid rondom de insteekplaats;
- pijn of zwelling van de bovenarm, nek of borstkas;
- koorts en/of rillingen;
- kortademigheid of hoesten;
- verplaatsing van de katheter;
- bloeding of lekkage bij de insteekplaats;
- loskomen van het verband.

Neem in bovenstaande situaties direct contact op met het ziekenhuis. Van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren belt u de verpleegkundig specialist oncologie of de oncologieverpleegkundige via 020 - 755 7035, of de verpleegkundigen van de dagbehandeling via 020 - 755 6629. In de avond, nacht en in het weekend belt u het algemene telefoonnummer van Ziekenhuis Amstelland, 020 - 755 7000.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl