

Tekenbeet

Tekenbeet

U bent zojuist op de Spoedeisende hulp behandeld voor een tekenbeet. Dat is meestal onschuldig. In sommige gevallen echter kan een tekenbeet na enige weken klachten veroorzaken die u zelf niet zo snel in verband zou brengen met de tekenbeet. Daarom vertellen wij u waar u op moet letten.

Behandeling

De arts van de afdeling Spoedeisende hulp heeft de teek in zijn geheel verwijderd. Net als bij een wespensteek heeft u nog een paar dagen last van een bult en roodheid op de plaats van de beet.

Tekenziekte

Een klein deel van de teken in Nederland is besmet met een soort bacterie die tekenziekte veroorzaakt, de zogenaamde ziekte van Lyme.

Eerste verschijnselen van tekenziekte

Na een aanvankelijke genezing op de plaats van de beet ontstaat, na drie tot acht weken, een rode vlek. Er ontstaan rode kringen. Deze zijn te vergelijken met de kringen in het water na het werpen van een steentje.

Wat moet u doen?

Als deze verschijnselen zich voordoen adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan de infectie dan nog goed behandelen met behulp van antibiotica, zonder dat u ziek wordt.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl