

Barbotage schouder

Inleiding

Bij een eerder röntgenonderzoek is gebleken dat de klachten die u heeft, veroorzaakt worden door een kalkophoping in de schouder. Deze kalkophoping in de schouder kan behandeld worden met een 'barbotage'. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met de ontblote schouder op de onderzoekstafel. De radioloog maakt de schouder schoon met huidalcohol en verdooft u eerst. Met behulp van echo wordt de kalkophoping in uw schouder in beeld gebracht. Daarna prikt de radioloog de kalkophoping aan. Zo wordt geprobeerd de verkalking te fragmenteren: in zoveel mogelijk kleine stukjes te verdelen. Er wordt ook geprobeerd om wat kalkfragmentjes op te zuigen. De fragmentatie zorgt ervoor dat er een ontsteking ontstaat, waarbij het lichaam zelf de kalkdeeltjes op moet ruimen. De verdoving die is aangebracht, werkt enkele uren. Tevens wordt 1 ml Depo-Medrol in het gewricht gespoten.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u tijdelijk een toename van de

pijnklachten ervaren. Dit komt door de veroorzaakte ontstekingsreactie en is normaal. Na dit onderzoek mag u niet zelf autorijden. Zorg daarom voor ander vervoer naar huis. Bij het gebruik van Prednison bestaat er een kans op een suikerdip.

De uitslag

De behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl