

## Insulinepomp instructie

### Kenmerken insulinepomp

- De insulinepomp geeft een bepaalde hoeveelheid insuline af gedurende 24 uur.
- Er wordt alleen gebruik gemaakt van ultra kortwerkende insuline.
- U heeft geen langwerkende insuline in voorraad.

### Welke problemen kunnen ontstaan als u alleen kortwerkende insuline gebruikt?

- Als er problemen ontstaan met de insulinepomp of het toedieningssysteem, dan heeft u geen voorraad insuline in uw bloed zoals bij een langwerkende insuline die met een insulinepen gespoten wordt.
- De glucose stijgt in snel tempo en kan snel tot ernstige klachten leiden.

### Wat kunnen de klachten zijn?

- Hoge bloedglucosewaarden die niet met de insulinepomp te corrigeren zijn.
- Ziek voelen, snelle/diepe ademhaling.
- In het ergste geval braken.

### **Bij braken altijd bellen!**

U kunt de internist bereiken door te bellen met de receptie van Ziekenhuis Amstelland en te vragen naar de dienstdoende internist, telefoonnummer 020 – 755 7000.

Het telefoonnummer van de diabetesverpleegkundige is 020 – 755 7007.

### Hoe te handelen bij te hoge glucosewaarden?

- Controleer de pompfunctie en de pompstand.
- Verwissel het toedieningssysteem en naaldje.
- Bij niet of nauwelijks resultaat altijd overleg met de internist of diabetesverpleegkundige.
- In eerste instantie moet er een extra bolus gegeven worden via de insulinepomp op basis van de boluscalculator of:
  - 4 EH bolussen bij een bloedglucose waarde boven de 15 mmol/l tot 20 mmol.
  - 6 EH bolussen bij een bloedglucose waarde boven de 20 mmol/l.
- Iedere 2 uur de bloedglucosewaarde meten.
- Geeft dit bij controle geen resultaat dan **snelwerkende insuline** met de **insulinepen** toedienen:
  - 4 EH bij een bloedglucosewaarde boven de 15 mmol/l tot 20 mmol/l of
  - 6 EH bij een bloedglucosewaarde boven de 20 mmol/l.

### Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl