

Foam-sclerotherapie bij spataderen

Uw specialist heeft met u een foam behandeling van uw spataderen afgesproken. In deze folder leest u meer over deze behandeling. Deze informatie is aanvullend op uw gesprek met de arts.

De behandeling wordt uitgevoerd door één van de leden van het spataderteam, bestaande uit de Physician Assistant N. Veer, en de chirurgen D.A.A. Stigter, M.L.P. van Zeeland en C.C. Ferwerda.

Locatie

De behandeling vindt plaats in het behandelcentrum, afdeling C36. U kunt zich op de afgesproken tijd melden.

Vorbereiding

- U bespreekt van tevoren met uw arts of u dient te stoppen met bloedverduunners.
- U kunt het beste ruime kleding dragen naar de behandeling. Liever geen lange onderbroek.
- Direct na de behandeling wordt er een steunkous aangedaan. Deze krijgt u na de behandeling, u hoeft hiervoor niets te doen.
- Wij vragen u om op de dag van de behandeling geen zalf of crèmes op uw benen te smeren.

De behandeling

Onder echogeleide wordt de spatader aangeprikt met een klein naaldje. Vervolgens wordt de sclerosans in de ader gespoten. Dit kan een wat prikkend gevoel geven, doordat het middel een irriterende werking heeft op de vaatwand. Als de sclerosans op zijn plek

zit, krijgt u direct de steunkous aan. Door de compressie die de steunkous geeft, in combinatie met de werking van de vloeistof, wordt de spatader dichtgedrukt en verkleven de vaatwanden. Dit resulteert in veel gevallen in het volledig optisch verdwijnen van de spatader.

Risico's en complicaties

Complicaties of ongewenste neveneffecten treden gelukkig zelden op. In sommige gevallen kunnen de volgende complicaties of neveneffecten voorkomen:

- (oppervlakkige) trombose
- Ontsteking of hematoom (blauwe plek)
- Huidverkleuring
- Allergische reactie

Bovenstaande reacties zijn in de meeste gevallen van tijdelijke aard.

Na de behandeling

Direct na de behandeling krijgt u een steunkous aan. Deze dient u in principe 2-3 dagen dag en nacht aan te houden. Hierna houdt u de kous nog 2 weken overdag aan. Het pleistertje mag dan ook verwijderd worden. Een trekkend gevoel in het been kan zo'n één tot twee weken aanhouden. U kunt ook blauwe plekken in het behandelde gebied zien of verhardingen voelen. Dit is normaal en kan enkele weken aanhouden.

Voor eventuele napijn kunt u paracetamol nemen.

Wij adviseren u om de eerste vier weken niet te zonnebaden in verband met mogelijke verkleuring van de huid. Ook wordt intensief sporten afgeraden in de eerste 2 weken na de behandeling.

Controle

U krijgt een controleafspraak bij uw arts om het resultaat van de behandeling te bespreken. Dit kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak in het ziekenhuis.

Vragen/contact

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze folder of de behandeling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met polikliniek chirurgie via telefoonnummer 020- 755 7014.

Maakt u zich zorgen? U kunt buiten kantooruren contact opnemen met de receptie van Ziekenhuis Amstelland, via telefoonnummer: 020 – 755 7000. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts. Binnen kantooruren kunt u bellen met de polikliniek chirurgie.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst op te zoeken, verwijzen wij u naar onze website en de website van de Hart en Vaat groep.

www.ziekenhuisamstelland.nl

<http://www.hartenvaatgroep.nl/>

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl